

# סטטיסטיקה והסתברות

פרק 38 - התפלגות גמא (ארלנג)

תוכן העניינים

1. התפלגות ארלנג ..... 1

## התפלגות ארלנג:

### רקע:

התפלגות זו הינה התפלגות רציפה התלויה בשני פרמטרים:  $k$  ו- $\lambda$ .  
 $X \sim Erlang(k, \lambda)$

הפרמטר  $k$  הוא מספר שלם וחיובי פרמטר זה גם נקרא פרמטר הצורה.  
 הפרמטר  $\lambda$  הוא פרמטר ממשי וחיובי שנקרא פרמטר הקצב.  
 תחום ההגדרה של ההתפלגות הוא  $X \geq 0$ .

בהנחה ולפנינו תהליך עם זרם פואסוני הזמן הדרוש עד הופעת האירוע ה- $k$  מרגע מסוים מתפלג התפלגות ארלנג כאשר הפרמטר  $\lambda$  מייצג את קצב האירועים ביחידת זמן.

### דוגמה:

מספר הפניות למוקד מתפלג פואסוני עם קצב של 3 פניות לדקה.  
 מהי ההתפלגות של הזמן שעובר מרגע פתיחת המוקד ועד קבלת הפניה הרביעית?

$W_i \sim P(\lambda = 3)$  - מספר הפניות למוקד בדקה.

$$k = 4$$

$X \sim Erlang(4, 3)$  - הזמן בדקות עד לפניה הרביעית.

פונקציית הצפיפות של  $X$  בהתפלגות ארלנג:  $f(x) = \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!}$

פונקציית ההתפלגות המצטברת של ההתפלגות:  $F(t) = P(X \leq t) = 1 - \sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{i!} (\lambda t)^i \cdot e^{-\lambda t}$

**בהמשך לדוגמה:**

מה ההסתברות שמרגע פתיחת המוקד יעברו פחות מ-2 דקות עד שהפניה הרביעית תתקבל במוקד?

$X \sim Erlang(4,3)$  - הזמן בדקות עד לפניה הרביעית.

$$P(X \leq 2) = F(2) = 1 - \sum_{i=0}^3 \frac{1}{i!} \cdot (3 \cdot 2)^i \cdot e^{-3 \cdot 2} = 1 - e^{-6} \left( \frac{6^0}{0!} + \frac{6^1}{1!} + \frac{6^2}{2!} + \frac{6^3}{3!} \right) = 0.8488$$

$$. E(X) = \frac{k}{\lambda} \quad \text{התוחלת של ההתפלגות:}$$

$$. V(X) = \frac{k}{\lambda^2} \quad \text{השונות של ההתפלגות:}$$

**בהמשך לדוגמה:**

מהי התוחלת וסטיית התקן של הזמן שיחלוף מרגע פתיחת המוקד ועד שתתקבל הפניה הרביעית למוקד?

$X \sim Erlang(4,3)$  - הזמן בדקות עד לפניה הרביעית.

$$. E(X) = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3} \quad \text{דקות}$$

$$. V(X) = \sqrt{\frac{4}{3^2}} = \frac{2}{3} \quad \text{דקות}$$

אם:  $X_1, X_2, \dots, X_k$  משתנים מקריים מעריכיים בלתי תלויים כך ש- $X_i \sim \exp(\lambda)$

$$. \sum_{i=1}^k X_i \sim Erlang(k, \lambda) \quad \text{עבור כל: } 1 \leq i \leq k, \text{ אזי:}$$

### בהמשך לדוגמה:

הראו את הקשר בין התפלגות ארלנג להתפלגות המעריכית בדוגמה המוצגת.

$X_i \sim \exp(\lambda)$  - הזמן בדקות בין פניה לפניה.

$X_i$  - ב"ת.

$k = 4, i = 1, 2, 3, 4$ .

$X_1$  - הזמן עד הפניה הראשונה.


$X_2$  - הזמן בין הפניה הראשונה לשנייה וכו'...

הזמן הכולל עד הפניה הרביעית בדקות -  $\sum_{i=1}^4 X_i = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \sim Erlang(k = 4, \lambda = 3)$

## גרפים של פונקציית הצפיפות בהתפלגות ארלנג:

$k = 2$

מקרא:




$\lambda = 1$  —————

$\lambda = 2$  —————

$\lambda = 3$  —————

$\lambda = 1$

מקרא:



$k = 1$  —————

$k = 2$  —————

$k = 4$  —————

## שאלות:

- (1) נתון:  $X \sim Erlang(2,5)$ .
- א. מצאו את:  $P(X > 3)$ .
- ב. מצאו את:  $P(X > 3 | X > 5)$ .
- ג. מצאו את:  $E(X)$ .
- (2) צריכת החשמל היומית בחברה מסוימת מתפלגת התפלגות ארלנג עם תוחלת 2 ושונות 2.
- א. מה ההסתברות שצריכת החשמל היומית בחברה תעלה על 4?
- ב. מה ההסתברות שצריכת החשמל היומית בחברה תעלה על 2 אך לא תהיה יותר מ-5?
- ג. החברה עובדת 5 ימים בשבוע, מה תוחלת מספר הימים בשבוע בה צריכת החשמל היומית בחברה קטנה מ-4?
- (3) אורך החיים של סוללה מתפלג מעריכית עם תוחלת של 4 שעות באופן בלתי תלוי בסוללה אחרת. במכשיר מתקינים 4 סוללות. בכל רגע נתון רק סוללה אחת מפעילה את המכשיר. ברגע שסוללה מתרוקנת היא מוחלפת במיידית בסוללה אחרת עד אשר כל ארבע הסוללות מתרוקנות.
- א. מה התוחלת והשונות של אורך חיי מערכת הסוללות במכשיר?
- ב. מה ההסתברות שאורך חיי מערכת הסוללות במכשיר יהיה נמוך מיממה?
- ג. מה ההסתברות שאורך חיי מערכת הסוללות במכשיר יהיה גדול מיומיים אם ידוע שהיה גדול מיממה?
- (4) מספר תקלות המחשב במערכת מתפלג פואסונית על קצב של 3 תקלות בשעה.
- א. מה ההסתברות שהזמן עד התקלה הראשונה יהיה קטן משעה?
- ב. מה ההסתברות שהזמן עד התקלה השנייה יהיה קטן משעה?
- ג. מה ההסתברות שהזמן עד התקלה השלישית יהיה קטן משעה?
- ד. הסבירו את ההבדלים בין הסעיפים.
- (5) הוכיחו שאם:  $X \sim Erlang(k, \lambda)$ , אזי מתקיים ש- $E(X) = \frac{k}{\lambda}$ ,  $V(X) = \frac{k}{\lambda^2}$ .  
 רמז: היעזרו בקשר בין התפלגות ארלנג להתפלגות המעריכית.

- (6) פונקציית ההתפלגות המצטברת של התפלגות ארלנג הנה:  $1 - \sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{i!} (\lambda t)^i \cdot e^{-\lambda t}$
- הראו דרכה שפונקציית הצפיפות של ההתפלגות ארלנג היא:  $f(x) = \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!}$

### תשובות סופיות:

- |           |            |  |     |
|-----------|------------|--|-----|
| ג. 0.4    | ב. 1       | א. 0.000005  | (1) |
| ג. 4.5425 | ב. 0.36558 | א. 0.0915  | (2) |
| ג. 0.0023 | ב. 0.8488  | א. תוחלת: 16 שעות, שונות: $64$ (שעות) <sup>2</sup> | (3) |
| ג. 0.5768 | ב. 0.8009  | א. 0.9502  | (4) |
|           |            | ד. ראה סרטון.                                      |     |
|           |            | שאלת הוכחה.  | (5) |
|           |            | שאלת הוכחה.  | (6) |